



**PEQUEÑA GUÍA DE AVES DE
CARDENETE
CRA MIGUEL DE CERVANTES**



CUERVO *CORVUS CORA*

Plumaje negro con reflejos azulados o púrpuras. El pico es fuerte, negro y ligeramente curvado.

Lo encontramos en bosques grandes.

El cuervo es omnívoro y oportunista.

Dicen las personas mayores que viven 100 años.

CORNEJA, GRAJO, *CORVUS CORONE*

Plumaje homogéneamente negro — con algunos reflejos metálicos en la cabeza, las alas y el dorso—, el mismo color que exhibe en las patas y en su robusto pico. Un poco más pequeña que el cuervo.

Prefiere los medios más o menos abiertos con algo de arbolado, cultivos, pastizales y sotos ribereños.

Se trata de una especie oportunista y omnívora, animales invertebrados, huevos y granos del suelo.



GRAJILLA, *CORVUS MONEDULA*

Córvido de pequeño tamaño y pico corto de pluma negra en machos y hembras.

Vive bosques abiertos, cortados rocosos y ambientes urbanos.

Se alimenta de insectos, gusanos, fruta caída, semillas y basura.

Tiene un elaborado comportamiento social. Se las trata de ladronas.



URRACA, MARICA, *PICA PICA*

Plumaje igual en machos y hembras. Cabeza, cuello, dorso y pecho negros, el vientre blanco, alas blancas y negras, cola negra.

Vive en zonas boscosas, abiertas y zonas despejadas.

Se alimenta de insectos, cereales, carroña, huevos y polluelos.

Le gustan los objetos brillantes.



ARRENDAJO, *GARRULUS GLANDARIUS*

Muy llamativo con plumaje dominado por los tonos ocre, con ciertos tintes rosados y grisáceos, plumaje azul claro en el pliegue alar. Obispillo blanco.

Vive en bosques y también frecuenta zonas suburbanas y parques. Anida en árboles.

Puede comer orugas, lombrices, saltamontes, escarabajos, huevos y pollos de otras aves y frutos silvestres.

Cuando un animal pasa por su zona lo persigue emitiendo un sonido y alertando a sus compañeros.

AUTILLO, *OTUS SCOPS*

Plumaje grisáceo o rojizo lleno de salpicaduras como de camuflaje. Tiene unas falsas “orejas”. Iris amarillo y pico negro.

Habita en árboles próximos a los ríos con espacios abiertos para cazar. También en parques y jardines.

Come invertebrados de tamaño considerable aunque a veces captura pequeños vertebrados.

Es el búho más pequeño. Su canto es un tiuu aflautado repetido cada 2 segundos. Se empareja para toda la vida.



LECHUZA, *TYTO ALBA*

El plumaje del macho es pardo y dorado claro, en las hembras los colores son más fuertes que los del macho.

Suelen hacer los nidos en las torres de la iglesia.

Come ratones, lagartijas, insectos, gusanos,...

Suelen cazar de noche.



MOCHUELO COMÚN, *ATHENE NOCTUA*

El plumaje del macho es pardo con manchas blancas y grandes ojos amarillos. La hembra es más grande que el macho y es difícil de distinguir.

Hace su nido en una cavidad: un árbol hueco, una grieta en las rocas, un edificio en ruinas...

Se alimenta de roedores, pequeñas aves e insectos.

Al atardecer se le suele escuchar en ramas, normalmente su canto es una especie de maullido, como kiú.



BITRE LEONADO, *GYPS FULVUS*

Color canela en el plumaje del dorso, el vientre y la franja anterior de las alas, mientras que el resto de las plumas alares y de la cola son pardas oscuras. La cabeza y el largo cuello están cubiertos de un plumón blanco.

Anida en cortados rocosos.

Se alimenta de animales muertos (especialmente grandes mamíferos).

Ave protegida.

ALIMOCHÉ, *NEOPHRON PERCNOPTERUS*

Se caracterizan por su cabeza y patas amarillas, cuerpo blanco, alas blancas con extremos grises y negros y cola blanca y ancha. Los jóvenes son pardos.

Anidan en abrigos en cortados rocosos.

Se alimenta de carne descompuesta.

Es un ave en peligro de extinción.





CERNÍCALO VULGAR, *FALCO TINNUNCULUS*

Macho con cabeza azul grisácea y alas de color bermejo. Las hembras son de color pardo.

Caza en zonas abiertas de cultivo.

Se alimenta de roedores, reptiles, insectos y pequeños pájaros.

Se queda quieto en el aire moviendo sus alas.

GAVILÁN COMÚN, *ACCIPITER NISUS*

Plumaje gris intenso en el macho y más pardo en la hembra, esta es de mayor tamaño que su pareja.

Vive en claros del bosque y pastos entre árboles.

Se alimenta de aves como gorriones y palomas.

Caza con gran agilidad entre los árboles.



ABEJARUCO, *MEROPS APIASTER*

Pecho azul, vientre verdoso, cuello amarillo, antifaz negro, pico fino, largo y curvo
En las hembras tonos más verdosos y pálidos que los machos.

Viven en zonas abiertas, cultivos, pastizales, etc.

Se alimenta de insectos, como abejas, mariposas, libélulas, avispas,...

Anida en agujeros hechos en taludes de arena.



ABUBILLA, *UPUPA EPOPS*

El plumaje puede variar entre un pardo rosado a un canela oscuro con las alas y la cola listadas de blanco y negro. Mancha anaranjada intensa en el pecho. Luce en su cabeza una llamativa cresta de color ocre y con las puntas negras.

Viven en bosques claros, frutales, viñedos y campos cultivados con árboles.

Se alimenta de larvas y pupas de insectos enterrados o entre la hojarasca.

Utilizan el mal olor de sus nidos como medio de defensa.



ZORZAL CHARLO, TORDENCHA, *TURDUS VISCIVORUS*

Machos y hembras presentan un plumaje pardo grisáceo y muy claro por abajo.

Habita en árboles altos.

Come frutos, insectos, lombrices y caracoles. Puede comer el fruto del muérdago.

Mayor pájaro cantor europeo. Muy agresivo.

ESTORNINO NEGRO, TORDO, *STURNUS UNICOLOR*

En invierno tienen un color negro grisáceo ligeramente moteado. Al llegar la primavera adquieren un plumaje más negro y más brillante. Las patas son rosadas y sus estrechos y puntiagudos picos tienen tonalidad amarilla.

Se encuentra en cultivos, parques, jardines y núcleos urbanos.

Se alimenta de invertebrados, frutos y semillas.

Es capaz de imitar sonidos que se oyen en la ciudad, silbidos, canto de otras aves y chasquidos.



SERÍN VERDECILLO, GAFARRÓN, *SERINUS SERINUS*

Los machos tienen el pecho y vientre amarillo, dorso verde, alas y cola verde. En las hembras espalda parda y pecho gris.

Se encuentra en bosques, jardines, huertos y árboles.

Come todo tipo de semillas y frutos.

Es una de las aves que más temprano anuncia la primavera.



VERDERÓN COMÚN, *CHLORIS CHLORIS*

El macho es verde esmeralda con manchas amarillas en hombro, alas y cola. La hembra es muy parecida pero con colores más discretos que los machos.

Vive en huertos, jardines, pinares, matorrales y eriales.

Se alimenta de todo tipo de semillas.

Es uno de los pájaros cantores más urbanos.





PINZÓN VULGAR, NEVERO, *FRINGILLA COELEBS*

El macho tiene un plumaje llamativo, frente negra, hombros y nuca color gris azulado, la espalda es roja. La hembra tiene cabeza y partes superiores amarillas y más oscuras en el centro, la espalda es verde amarillento y las alas blanquecinas,

Se encuentra en bosques y también ocupa parques y jardines.

Come insectos, semillas, bayas y brotes.

Aves cantoras con grandes dotes musicales

JILGUERO EUROPEO, COLORÍN, *CARDUELIS CARDUELIS*

En la cabeza muestran una característica careta roja, junto a sendas manchas blanca y negra. Su cola es negra y las plumas más externas de la cola pueden tener amplias manchas blancas. Alas con dos bandas de color amarillo dorado.

Vive en olivares, pastizales con arbolado, dehesas y vegas fluviales.

Se alimenta de granos, experto en extraer las semillas de los cardos.

Ponen 5 huevos de color azul que eclosionan en 12 días.



PETIRROJO, *ERITHACUS RUBECULA*

El macho presenta el pecho y cara naranja, bordeados por un gris azulado. Partes superiores marrones y patas marrones.

Viven en bosques húmedos, parques o jardines con maleza.

Se alimenta de insectos, arañas, lombrices, caracoles, bayas y frutos.

Son tan territoriales que pueden luchar contra un trozo de tela rojo.



PARDILLO, *CARDUELIS CANNABINA*

Su plumaje tiene color pardo en el dorso y ocre muy pálido en los flancos y el vientre. Los machos resultan inconfundibles en primavera, pues lucen un llamativo color carmín en la frente y el pecho.

Vive en zonas cerealistas y también resulta común en los matorrales.

Come semillas de plantas silvestres y algunos insectos.

El canto consiste en gorjeos alegres y variados.





GORRIÓN COMÚN, *PASSER DOMESTICUS*

EL macho es gris en las partes inferiores y en el píleo (parte superior de la cabeza), tiene una mancha negra en el pecho, dorso castaño y espalda gris. En las hembras la frente y píleo de color pardo oscuro.

Anidan en grietas de edificios, debajo de tejas o en troncos de coníferas.

Maíz, avena, trigo soja y hierba..

No caminan, dan saltos pequeños para comunicarse.

CARBONERO COMÚN, *PARUS MAJOR*

En los machos, sus alas, cola y cabeza tienen un color azulado, un collar azul, dorso verdoso y sus partes inferiores amarillas. En la hembra aparecen los mismos colores que el macho pero más apagados y menos brillantes.

Vive en jardines, huertos y bosques.

Se alimenta de insectos y semillas.



HERRERILLO COMÚN, CHICHIPAN, *CYANISTES CAERULEUS*

Macho y hembra muestran el mismo plumaje. Alas, cola y capirote azules, mejillas blancas, dorso verde y partes inferiores amarillas.

Vive en agujeros de árboles, cajas, huecos en muros,...

Se alimenta de pulgones, orugas, frutos, granos y semillas.

Pueden tener mas de una pareja, depende de la alimentación y del lugar.



LAVANDERA BLANCA, PAJARILLA DE LAS NIEVES, *MOTACILLA ALBA*

Plumaje igual en machos y hembras, cola negra, alas grises y blancas, patas y pico negros, cara rodeada de negro.

Vive en zonas urbanas y cerca de zonas fluviales.

Come pequeños insectos, gusanos, etc.

Se dice que su presencia anuncia la llegada del frío.





RUISEÑOR COMÚN, *LUSCINIA MEGARHYNCHOS*

Plumaje discreto, cola larga y presenta un color pardo ocráceo uniforme, la cola es de un distintivo tono pardo rojizo. Las partes inferiores de color blanco crema.

Vive en zonas enmarañadas y frescas preferentemente en zonas ribereñas.

Come escarabajos, hormigas, mosquitos, arañas, gusanos, etc.

Ave migratoria con un canto muy suave y es muy escondidizo.


MIRLO, MERTA, *TURDUS MERULA*

Tonos uniformes y oscuros, el macho luce color negro, con el pico y el anillo ocular anaranjados. La hembra es marrón oscura, con el pico amarillento o parduzco.

Vive en zonas cubiertas por árboles y arbustos. También en parques y jardines de ciudades y pueblos.

Se alimenta de insectos, lombrices y frutos diversos.

Tiene una vida de 24 años.



MARTÍN PESCADOR, *ALCEDO ATTHIS*

El dorso de la cabeza, cuerpo y alas es azul turquesa, vientre anaranjado. Pico largo de color negro.

Vive en aguas tranquilas o de flujo lento, como lagos, canales y ríos.

Come pequeños peces e insectos acuáticos.

Se confunde con reflejos en el agua.



ALCAUDÓN REAL, *LANIUS MERIDIONALIS*

Pecho y vientre color blanco-rosado, larga cola, cabeza voluminosa y pico robusto, dorso y cabeza gris, antifaz negro y alas negras con mancha blanca.

Vive en arboledas, pastizales, dehesas, olivares, zonas abiertas de matorral y paraje agrario con cultivo.

Tiene pico más propio de rapaz. Come insectos grandes, como escarabajos o saltamontes, ratones, pajarillos y reptiles.

Almacena comida en ramas punzantes.





PERDIZ COMÚN, *ALECTORIS RUFA*

La parte del pecho tiene un veteado negro más intenso en la hembra. Vientre anaranjado y flancos con barras blancas, negras, marrones y grises, garganta blanca, dorso pardo grisáceo; y patas, pico y anillo ocular rojos.

Vive en montes bajos de clima seco, tierras de agricultura y áreas abiertas y pedregosas.

Come semillas e insectos pequeños.

Anida en el suelo y no sube a los árboles.

ALONDRA TOTOVÍA, TOTOVÍA, *LULLULA ARBOREA*

Las partes superiores son pardas, densamente rayadas de negro, el pecho con rayas negras.

Ocupa espacios abiertos y de borde forestal, pastizal con matorral o de bosques abiertos.

Come insectos y arañas, también es granívora.

Uno de los mejores cantores del mundo de las aves.



PALOMA TORCAZ, TORCAZ, *COLUMBA PALUMBUS*

Son de color gris azulado claro, pero marcado con barras alares blancas, parches blancos alrededor del cuello y purpúreos en el pecho.

Vive en oquedades, sitios cerrados, bosques y en algunas ciudades.

Se alimenta de piñones, bellotas, semillas de gramíneas, insectos y lombrices.



PALOMA DOMÉSTICA, *COLUMBA LIVIA*

Su plumaje es en general de color gris azulado, se caracteriza por presentar dos bandas en las alas negras.

Las paloma doméstica se encuentra asociada a construcciones humanas rurales y urbanas.

Se alimenta de legumbres, granos, semillas y desechos de comidas.

Se pueden domesticar para hacerlas mensajeras y en investigaciones científicas.





TÓRTOLA TURCA, *STREPTOPELIA DECAOCTO*

Su plumaje en general es de color beige grisáceo, en la parte superior se puede ver un tono ocráceo con cierto matiz rosado en la cabeza y el pecho. En el cuello tiene un collar negro.

Ocupan ambientes urbanos y su entorno (jardines, arboledas, etc.).

Se alimenta de granos de cereal, semillas herbáceas.

Tiene un canto alto y repetitivo insistentemente.

PITO REAL, *PICUS VIRIDIS*

Es de color verdoso, con el obispillo más amarillo y la parte de la cabeza y nuca de color rojo. El macho tiene una mancha roja en la bigotera.

Vive en zonas forestales y arboladas. No es raro que frecuente parques y jardines.

Come principalmente insectos que viven en la madera y hormigas que captura sobre la corteza de los árboles o en el suelo.

Tiene un reclamo de carcajada larga.



PICO PICAPINOS, PÁJARO CARPINTERO, *DENDROCOPOS MAJOR*

Región dorsal blanquinegra, listas negras a los lados de la cara y cuello, vientre blanco y en la zona de la cola rojo llamativo. Los machos tienen la nuca roja.

Típico de toda clase de bosque, anida haciendo un profundo túnel en la madera de algún árbol.

Se alimenta de larvas e insectos. En invierno piñones, bellotas, y otros frutos secos.



GOLONDRINA, *HIRUNDO RUSTICA*

De color negro con una franja de plumas de color azul oscuro que separa la garganta del pecho, recubierto por un plumaje blanquecino.

Hace nidos de barro preferentemente en construcciones como establos, porches, patios y terrazas.

Son insectívoras, comen insectos, gusanos y lombrices.

Decían que no las mataran porque eran los pájaros de Dios.



VENCEJO, *APUS APUS*



Coloración uniforme de tono pardo oscuro, casi negro, excepto en la garganta, que es blanca.

Hace sus nidos en los huecos de los aleros de construcciones humanas.

Se alimenta de pequeños insectos voladores, los coge en vuelo con su amplio pico abierto a modo de cazamariposas.

Solo deja de volar mientras empollan y puede pasar hasta tres años sin tocar suelo. Si cae a tierra no puede levantar el vuelo.

AVIÓN COMÚN, *DELINCHON URBICUM*

Partes superiores negras con matices azulados, partes inferiores blancas.

Hace sus nidos de barro cada año en el mismo sitios en puentes, torres o aleros de casas.

Se alimenta de insectos voladores.

A la localidad llegaron hace unos 20 años.



TABLA DE OBSERVACIÓN

Abejaruco		Buitre leonado		Gorrión común		Mochuelo común		Pito real	
Abubilla		Carbonero común		Grajilla		Pájaro carpintero		Ruiseñor común	
Alcaudón real		Cernícalo		Herrerillo común (chichipán)		Paloma doméstica		Serín verdecillo (gafarrón)	
Alimoche		Corneja		Jilguero europeo (colorín)		Paloma torcaz		Tórtola turca	
Alondra totovía		Cuervo		Lavandera blanca (pajarilla de las nieves)		Pardillo		Urraca (marica)	
Arrendajo		Estornino negro (tordo)		Lechuza		Perdiz común		Vencejo	
Autillo		Gavilán		Martín pescador		Petirrojo		Verderón común	
Avión común		Golondrina		Mirlo común (merta)		Pinzón vulgar (nevero)		Zorzal charlo (tordencha)	

Coordinador: David Zúñiga Evisa

Investigadores:

- **Lucía Gascón Gil (3º Primaria)**
- **Candela Martínez Evangelio (3º Primaria)**
- **Alba Ubiedo Palomares (3º Primaria)**
- **María Urbán García (5º Primaria)**
- **Héctor Caballero Morosanu (6º Primaria)**
- **Nerea Herráiz Martínez (6º Primaria)**
- **Alex Herreros Buleo (6º Primaria)**

Fotos cedidas por Javier Merchante Rodríguez